


როგორი პრეპარატია რიდომილზე უფრო ეფექტური
ჭრაქისა და ფიტოფტორას წინააღმდეგ?

ესაა ახალი რიდომილ გოლდი®



ძირითადი ღირსებები:

- * უმაღლესი ხარისხის კომბინირებული შემადგენლობის ფუნგიციდი, საიმედო და ეფექტური კარტოფილის ფიტოფტორას, ვაზის ჭრაქის და სხვა კულტურების დაავადებათა წინააღმდეგ.
- * ორმაგი მოქმედების უნარი: სისტემური (შეიცავს მეტალაქსილ მ, იგივე მეფენოქსამი) და კონტაქტური (მანკოცები).
- * კომპლექსურად იცავს მთლიანად მცენარეს და მათ შორის ახალგაზრდა ყლორტებსა და წანაზარდებს, რომლებიც განვითარდნენ შესხურების შემდეგ.
- * იცავს ნაყოფებსაც და ტუბერებსაც.
- * მაღალი მოსავლისა და ჯანსაღი პროდუქტების მიღების გარანტია.
- * მცენარეში სწრაფი შეჭრისა და ხანგრძლივი მოქმედების უნარი.
- * რთულ კლიმატურ პირობებში (ხანგრძლივი წვიმები) გარანტირებული ეფექტი.
- * ახასიათებს მაღალი ეფექტურობა და სხვა დაავადებების, მაგ: ალტერნარიოზი (მაკროსპოროზი) წინააღმდეგ კარტოფილში, ვაზში და ბოსტნეულ კულტურებში.
- * მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია და ვარგისია ინტეგრირებული დაცვისათვის.

syngenta
შვეიცარია

რიდომილ გოლდი® რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი,
syngenta შვეიცარია

რიდომილ გოლდ მს 68% წყალში დისპერგირებადი გრანულაჰი

☉ მოქმედების სპექტრი და გამოყენების რეკომენდაცია



ჭრაქით, ფიტოფტოროზით და ალტერნარიოზით დაავადებული კულტურები

კულტურა	დაავადება	გამოყენების ჯირადოვა (მაძსიგ.)	ინტერვალი შესხურებებს შორის დღეებში	სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა	ლოდინის პერიოდი დღეებში
კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	3	10-14	300-500	20
ვაზი	ჭრაქი	4	10-14	600-800	20
პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	4	7-10	500-1500	10
კიტრი =>ლია გრუნტი	ჭრაქი	3	10-14	500	20
=>სათბურში		3	10-14	1500	3
ხახვი	ჭრაქი	3	10-14	300-500	20



სარჯვის ნორმა

2.5 კგ/ჰა

სტანდარტული შეფუთვა

1კგ და 5კგ

დამატებები

- ⇒ იმ შემთხვევაში თუ დაავადებათა განვითარებისათვის ზედმინევენით ხელსაყრელი პირობებია, მაშინ უნდა ვისარგებლოთ უფრო მოკლე ინტერვალებით.
- ⇒ გვახსოვდეს, რომ მაღალი ეფექტი მიიღება პროფილაქტიკური დამუშავებისას, არ დავეშვათ დაავადების მაღალი განვითარება და სწრაფი გავრცელება.
- ⇒ რიდომილ გოლდის გამოყენების შემდეგ აუცილებელია კონტაქტური ფუნგიციდით დამუშავება არაუგვიანეს მე-7 დღეს შესხურებიდან.

კონსულტაციებისა და დახმარებისათვის მოგვმართეთ



“ჩემი მამული” შპს

ქ. თბილისი 0119 ა. წერეთლის გამზ 142ა

ტელ: 95 12 00, 34 07 97

ტელ/ფაქსი: 35 72 41

ელ. ფოსტა: info@agro.com.ge